

Peñalolén, 09 de Septiembre de 2020

INFORMATIVO
VACUNACIÓN 1º BÁSICO – 8º BÁSICO.

Estimados Padres y/o Apoderados:

Junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren bien junto a sus familias, informamos que los (las) alumnos (as) de primeros y octavos años básicos serán vacunados en las siguientes fechas en nuestro establecimiento.

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 9:00 A 14:00 HRS. 1º BÁSICOS

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 9:00 A 14:00 HRS. 8º BÁSICOS

Las fechas indicadas son proporcionadas por el consultorio de Peñalolén Carol Urzúa, por lo que podrían ser modificadas. De ser así, se informará vía página web.

Se vacunarán 15 alumnos cada 30 minutos para mantener el distanciamiento y evitar contagios. Por ello, solicitamos seguir las indicaciones que estaremos dando el día de la vacunación, donde existirán zonas de espera en el caso que concurran más de 15 alumnos simultáneamente.

Los y las estudiantes deben ser acompañados por un adulto (apoderado, padre o madre), portando sus mascarillas.

PRIMERO BÁSICO

Se aplicará a todos (as) los (as) alumnos (as) que cursan 1º año de educación general básica las siguientes vacunas:

- 1.- Tres vírica; protege contra Sarampión, Rubeola y Paperas.**
- 2.- DTP a celular; protege contra Difteria, Tétano y Pertussis.**

Vacuna Tres vírica:

La administración de esta vacuna puede producir temperatura de hasta 37.5-38°C. Junto a ello, podría producir un exantema leve (puntitos rojos en zona de punción). Sólo dar paracetamol según lo indicado por su pediatra y esperar que el proceso cese.

Vacuna DTP:

La administración de esta vacuna puede producir molestias, dolor leve y enrojecimiento en el sitio de punción. Aplique compresas frías en la zona vacunada y administre paracetamol según indicación de su pediatra. Dichos síntomas deben desaparecer entre el segundo y tercer día.

OCTAVO BASICO

Se aplicará a todos (as) los (as) alumnos (as) que cursan 8º año de educación general básica la siguiente vacuna:

1.- DTP a celular; protege contra Difteria, Tétano y Pertussis.

La administración de esta vacuna puede producir molestias, dolor leve y enrojecimiento en el sitio de punción. Aplique compresas frías en la zona vacunada y administre paracetamol según indicación de su pediatra. Dichos síntomas deben desaparecer entre el segundo y tercer día

NOTA: Los (as) alumnos (as) repitientes no se vacunan si fueron vacunados el año anterior.

Los (as) alumnos (as) ausentes el día de la vacunación, deberán dirigirse al consultorio o centro de salud correspondiente a su domicilio.

La vacuna es obligatoria, sólo se excluirá de vacunación al alumno (a) que presente documento indicando que ya está vacunado.

CONTRAINDICACIONES PARA LAS VACUNAS

Estado febril sobre 38,5°, niños que cursan una enfermedad inmunodepresora (ej.: cáncer, leucemia, etc.) anafilaxia comprobada al huevo, anafilaxia a la Neomicina (estas dos últimas por vacuna tres vírica).

La Administración de la vacuna es de carácter OBLIGATORIA. Si usted vacunó a su hijo (a), éste debe presentar el respaldo correspondiente (documento o carne de vacunación).

Atentamente,

**Marta López González
INSPECTORA GENERAL**

**Marlene Mella Castillo
DIRECTORA ACADÉMICA**